

# 治療日誌 (服薬開始から24週間分)



- 記入例を参考に、服薬状況、症状などを記入しておきましょう。
- 表に記載している以外の症状があったら、メモ欄に記入しておきましょう。
- 受診日に日誌を持参して、服薬の状況や症状などについて伝えましょう。

## 記入例

ベネフレクスタの服薬開始日を記入します。

服薬開始日 **2022年 10月 1日(土)**

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

発熱した場合は、体温を記入します。

該当したら○をつけ、症状の程度(強・中・弱)または回数を記入します。

薬が飲めたら○をつけます。

気になる症状があれば、メモしておきましょう。

治療日誌

治療日誌

	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7		10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14
ベネフレクスタの服用 (飲めたら○)	○	○	○	○	○	○	○	ベネフレクスタの服用 (飲めたら○)	○	○	○	○	○	○	○
発熱	37.2℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
さむけ								さむけ							
疲労感	○強		○中				○強	疲労感							
めまい								めまい							
息切れ							○中	息切れ							
出血 (歯肉、鼻血)								出血 (歯肉、鼻血)							
吐き気	○中		○弱					吐き気							
嘔吐			○1					嘔吐							
下痢								下痢							
食欲減退			○中					食欲減退							
気になる症状をメモしておきましょう	少し熱っぽい		体重が減った				動くのがつらい	気になる症状をメモしておきましょう							あまり眠れなかった

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

毎日でも、何かあった時だけでも、自由に記入してください。

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

		/	/	/	/	/	/	/
ベネクレクスタの服用 (飲めたら○)								
症状	発熱	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	さむけ							
	疲労感							
	めまい							
	息切れ							
	出血 (歯肉、鼻血)							
	吐き気							
	嘔吐							
	下痢							
食欲減退								
気になる症状をメモしておきましょう								

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。