

# 治療日誌（服薬開始から5週間分）

- 記入例を参考に、その週に処方された1日分の薬の量と服薬状況、摂取した水分量、症状などを記入しておきましょう。
- 表に記載している以外の症状があったら、メモ欄に記入しておきましょう。
- 受診日に日誌を持参して、服薬の状況や症状などについて伝えましょう。



## 記入例

服薬開始日 **2019年 9 月 30 日(月)**

ベネクレクスタの服薬開始日を記入します。

医師から処方されたその週の1日分の薬の量(mgと錠数)を記入します。

治療日誌	1 週目	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
1日分の服用量 (のめたら○)	10 mg 2 錠	○	○	○	○	○	○	○
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)	4.0 本分	3.5 本分	4.5 本分	3.5 本分	3.8 本分	3.0 本分	4.0 本分	
症状	尿量が通常より少ない(程度)							
	さむけ(程度)							
	疲労感(程度)	○ 強	○ 中					
	息切れ(程度)							
	吐き気(程度)	○ 中	○ 弱					
	嘔吐(回数)							
	下痢(回数)		○ 1					
食欲減退(程度)								
発熱(体温℃)	37.2 ℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	
気になる症状を メモしておきましょう	少し熱っぽい	食欲がない			あまり眠れなかった			

1日に飲んだ水分量を500mLのペットボトルを目安として本数を記入します。

該当したら○をつけ、症状の程度(強・中・弱)または回数を記入します。

発熱した場合は、体温を記入します。

薬がのめたら○をつけます。

気になる症状があれば、メモしておきましょう。

治療日誌(1週目)

服薬開始日 年 月 日( )

治療日誌		1 週目	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
		1日分の服用量 (のめたら○)	<input type="text"/> mg <input type="text"/> 錠						
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分	<u>        </u> 本分
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

治療日誌		2週目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
1日分の服用量 (のめたら○)		<input type="text"/> mg <input type="text"/> 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			<u>      </u> 本分						
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

治療日誌		3週目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目
1日分の服用量 (のめたら○)		<input type="text"/> mg <input type="text"/> 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			<u>      </u> 本分						
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

治療日誌		4週目	22日目	23日目	24日目	25日目	26日目	27日目	28日目
1日分の服用量 (のめたら○)		<input type="text"/> mg <input type="text"/> 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			<u>      </u> 本分						
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日( )

治療日誌		5週目	29日	30日	31日	32日	33日	34日	35日
1日分の服用量 (のめたら○)		<input type="text"/> mg <input type="text"/> 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			<u>      </u> 本分						
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。