

治療日誌（服薬開始から5週間分）

- 記入例を参考に、その週に処方された1日分の薬の量と服薬状況、摂取した水分量、症状などを記入しておきましょう。
- 表に記載している以外の症状があったら、メモ欄に記入しておきましょう。
- 受診日に日誌を持参して、服薬の状況や症状などについて伝えましょう。



記入例

医師から処方されたその週の1日分の薬の量（mgと錠数）を記入します。

1日に飲んだ水分量を500mLのペットボトルを目安として本数を記入します。

該当したら○をつけたり、回数などを記入したりします。

服薬開始日 2025年12月22日(月)					
治療開始		週目	/	/	
体重			kg	kg	
体温			℃	℃	
1日(飲めど)の服用量	ベネクレクスタ	mg	○	○	
	アカラブルチニブ	mg	1回目	2回目	1回目
錠数			○	○	
服用時間			:	:	:
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			本	本	
消化器症状	食欲がない				
	下痢(回数)		3回	2回	
	吐き気・嘔吐(回数)		○		
感染症	せき				
	喉の痛み				
骨髄抑制	出血(鼻血や歯ぐきの出血など)				
	貧血(立ちくらみやめまいなど)			○	
その他	疲労				
	血圧		/	/	
	脈拍数				
	頭痛				
その他の気になることをメモしてください			少し熱っぽい	食欲がない	

ベネクレクスタの服薬開始日を記入します。

毎日の体重を記入します。

毎日の体温を記入します。

薬が飲めたら○をつけます。

薬が飲めた時間を記入します。

気になる症状があれば、メモしておきましょう。

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日 ()

治療開始 <input type="text"/> 週目		/		/		
体重		kg		kg		
体温		℃		℃		
1日 (飲めたら○) の 服用量	ベネクレクスタ	mg				
		錠				
	アカラブルチニブ	mg	1回目	2回目	1回目	2回目
		錠				
服用時間		:	:	:	:	
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		本		本		
消化器 症状	食欲がない					
	下痢 (回数)					
	吐き気・嘔吐 (回数)					
感染症	せき					
	喉の痛み					
骨髄抑制	出血 (鼻血や歯ぐきの出血 など)					
	貧血 (立ちくらみやめまい など)					
その他	疲労					
	血圧	/	/	/	/	
	脈拍数					
	頭痛					
	その他の気になることを メモしてください					

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

/		/		/		/		/	
kg		kg		kg		kg		kg	
℃		℃		℃		℃		℃	
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
本		本		本		本		本	

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日 ()

治療開始		週目	/		/	
体重			kg		kg	
体温			℃		℃	
1日 の 服用 量 (飲めたら○)	ベネクレクタ	mg				
		錠				
	アカラブルチニブ	mg	1回目	2回目	1回目	2回目
		錠				
服用時間			:	:	:	:
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			本		本	
消化器 症状	食欲がない					
	下痢 (回数)					
	吐き気・嘔吐 (回数)					
感染症	せき					
	喉の痛み					
骨髄抑制	出血 (鼻血や歯ぐきの出血 など)					
	貧血 (立ちくらみやめまい など)					
その他	疲労					
	血圧		/		/	
	脈拍数					
	頭痛					
	その他の気になることをメモしてください					

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクタの服用量を減らしたり、

/		/		/		/		/	
kg		kg		kg		kg		kg	
℃		℃		℃		℃		℃	
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
本		本		本		本		本	

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日 ()

治療開始		週目	/		/	
体重			kg		kg	
体温			℃		℃	
1日 の 服用 量 (飲めたら○)	ベネクレクスタ	mg				
		錠				
	アカラブルチニブ	mg	1回目	2回目	1回目	2回目
		錠				
服用時間			:	:	:	:
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			本		本	
消化器 症状	食欲がない					
	下痢 (回数)					
	吐き気・嘔吐 (回数)					
感染症	せき					
	喉の痛み					
骨髄抑制	出血 (鼻血や歯ぐきの出血 など)					
	貧血 (立ちくらみやめまい など)					
その他	疲労					
	血圧		/		/	
	脈拍数					
	頭痛					
	その他の気になることをメモしてください					

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

/		/		/		/		/	
kg		kg		kg		kg		kg	
℃		℃		℃		℃		℃	
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
本		本		本		本		本	

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日 ()

治療開始 <input type="text"/> 週目		/		/			
体重		kg		kg			
体温		℃		℃			
1日 の 服用 量 (飲めたら○)	ベネクレクスタ	mg					
		錠					
	アカラブルチニブ	mg		1回目	2回目	1回目	2回目
		錠					
服用時間		:	:	:	:		
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		本		本			
消化器 症状	食欲がない						
	下痢 (回数)						
	吐き気・嘔吐 (回数)						
感染症	せき						
	喉の痛み						
骨髄抑制	出血 (鼻血や歯ぐきの出血 など)						
	貧血 (立ちくらみやめまい など)						
その他	疲労						
	血圧	/	/				
	脈拍数						
	頭痛						
	その他の気になることを メモしてください						

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

/		/		/		/		/	
kg		kg		kg		kg		kg	
℃		℃		℃		℃		℃	
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
本		本		本		本		本	

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日 ()

治療開始 <input type="text"/> 週目		/		/		
体重		kg		kg		
体温		℃		℃		
1日 (飲めたら○) の 服用量	ベネクレクスタ	mg				
		錠				
	アカラブルチニブ	mg	1回目	2回目	1回目	2回目
		錠				
服用時間		:	:	:	:	
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		本		本		
消化器 症状	食欲がない					
	下痢 (回数)					
	吐き気・嘔吐 (回数)					
感染症	せき					
	喉の痛み					
骨髄抑制	出血 (鼻血や歯ぐきの出血 など)					
	貧血 (立ちくらみやめまい など)					
その他	疲労					
	血圧	/	/	/	/	
	脈拍数					
	頭痛					
	その他の気になることを メモしてください					

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、

/		/		/		/		/	
kg		kg		kg		kg		kg	
℃		℃		℃		℃		℃	
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
本		本		本		本		本	

服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。