

治療日誌（服薬開始から5週間分）

- 記入例を参考に、その週に処方された1日分の薬の量と服薬状況、摂取した水分量、症状などを記入しておきましょう。
- 表に記載している以外の症状があったら、メモ欄に記入しておきましょう。
- 受診日に日誌を持参して、服薬の状況や症状などについて伝えましょう。



記入例

服薬開始日 **2019** 年 **9** 月 **30** 日 (月)

ベネクレクスタの服薬開始日を記入します。

医師から処方されたその週の1日分の薬の量(mgと錠数)を記入します。

治療日誌

1 週目

1 日目

2 日目

3 日目

4 日目

5 日目

6 日目

7 日目

1日分の服用量
(のめたら○)

10 mg
2 錠

○

○

○

○

○

○

○

薬がのめたら○をつけます。

1日に飲んだ水分量を500mLのペットボトルを目安として本数を記入します。

1日に摂取した水分量
(500mLのペットボトルの本数)



4.0 本分

3.5 本分

4.5 本分

3.5 本分

3.8 本分

3.0 本分

4.0 本分

該当したら○をつけ、症状の程度(強・中・弱)または回数を記入します。

症状

尿量が通常より少ない(程度)

さむけ(程度)

疲労感(程度)

○ 強

○ 中

息切れ(程度)

吐き気(程度)

○ 中

○ 弱

嘔吐(回数)

下痢(回数)

○ 1

食欲減退(程度)

発熱した場合は、体温を記入します。

発熱(体温℃)

37.2 ℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

気になる症状を
メモしておきましょう

少し熱っぽい

食欲がない

あまり眠れなかった

気になる症状があれば、メモしておきましょう。

治療日誌(1週目)

服薬開始日 年 月 日()

治療日誌		1 週目	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
1日分の服用量 (のめたら○)		mg 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			本分	本分	本分	本分	本分	本分	本分
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔 吐(回数)								
	下 痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発 熱(体温℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日()

治療日誌		2週目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
1日分の服用量 (のめたら○)		mg 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			本分	本分	本分	本分	本分	本分	本分
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔 吐(回数)								
	下 痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発 熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日()

治療日誌		3週目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目
1日分の服用量 (のめたら○)		mg 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		500mL	本分	本分	本分	本分	本分	本分	本分
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日()

治療日誌		4週目	22日目	23日目	24日目	25日目	26日目	27日目	28日目
1日分の服用量 (のめたら○)		mg 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)			<u> </u> 本分	<u> </u> 本分	<u> </u> 本分	<u> </u> 本分	<u> </u> 本分	<u> </u> 本分	<u> </u> 本分
症 状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔 吐(回数)								
	下 痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発 熱(体温℃)		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。

服薬開始日 年 月 日()

治療日誌		5週目	29日目	30日目	31日目	32日目	33日目	34日目	35日目
1日分の服用量 (のめたら○)		mg 錠							
1日に摂取した水分量 (500mLのペットボトルの本数)		500mL	本分	本分	本分	本分	本分	本分	本分
症状	尿量が通常より少ない(程度)								
	さむけ(程度)								
	疲労感(程度)								
	息切れ(程度)								
	吐き気(程度)								
	嘔吐(回数)								
	下痢(回数)								
	食欲減退(程度)								
	発熱(体温℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	
気になる症状を メモしておきましょう									

副作用が現れたときなどは、医師の判断によりベネクレクスタの服用量を減らしたり、服用を中断することがあります。このような場合は、医師の指示に従ってください。